



MULTİMİX pediatrik şurup

KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir ölçek (5 ml) 2500 IU A vitamini, 0,9 mg B₁ vitamini, 1 mg B₂ vitamini, 1,3 mg B₆ vitamini, 45 mg C vitamini, 400 IU D₃ vitamini, 8,94 mg E vitamini, 3,5 mg D-Pantenol, 0,085 mg D-Biotin, 11 mg Nikotinamid içerir.

Yardımcı maddeler: Ksilitol, gliserin, propilen glikol, kremofor RH 40, DL-lakton, sodyum benzoat (E211), sodyum hidroksit, etanol, portakal esansı, demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MULTİMİX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MULTİMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MULTİMİX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MULTİMİX'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MULTİMİX nedir ve ne için kullanılır?

MULTİMİX, dengeli oranlarda bir araya getirilmiş bir vitamindir. İçeriğindeki vitamin miktarları 2-12 yaş arasındaki çocukların günlük gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanmıştır.

100 mililitrelik şişelerde bulunur.

İçeriğindeki vitaminlerin eksikliğinin görüldüğü veya gereksiniminin arttığı durumlarda eksikliğin giderilmesinde kullanılır. Şu durumlarda takviye

gerekebilir:

- Ani kilo kaybı, dengesiz ve yetersiz beslenme, günlük vitamin ihtiyacını karşılamayan beslenme (ör. süt alımının olmadığı vejeteryan diyetler)

- Yanıklar, ateş, kronik ateş, kronik hemodiyaliz (kanın temizlenmesi işlemi), karaciğer-safra kanalı hastalıkları, hipertiroidizm (tiroid bezinin fazla çalışması, belirtileri; metabolizmada hızlanma, kilo kaybı, terleme, güçsüzlük), uzamış hastalıklar/enfeksiyonlar, barsak hastalıkları, pankreas yetmezliğine bağlı olarak besinlerin yetersiz emilimi, protein eksikliği, yağ emiliminin bozulduğu durumlar

- Ağız-boğaz hasarları/bozuklukları, sarılık

2. MULTİMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MULTİMİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzun;

- İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine alerjisi varsa,
- Hipervitaminoz A ve D (vücuttaki vitamin fazlalığı) varsa,
- Hiperkalsemisi (kanda kalsiyum derişiminin normalden fazla olması) varsa,
- Retinoid tedavisi görüyorsa (epitel hücrelerin çoğalmasını engelleyen Avitamini sentetik türevi bir ilaç ile yapılan tedavi).

MULTİMİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsa;

- D vitamini içeren ilaçlar
- A vitamini içeren ilaçlar
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar
- Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MULTİMİX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ölçeğinde 100 mg'dan daha az etanol (alkol) içerir.





Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MULTİMİX'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Antikonvülsanlar
- Anestezi için kullanılan barbitüratlar
- Nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar
- Ganglionik blokörler (Sinir hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bölgelerde sinir iletimine engel olarak kan basıncını düşüren ilaçlar)

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MULTİMİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça: 6 yaşından küçük çocuklara günde yarım ölçek, 6 yaşından büyük çocuklara günde 1 ölçek veriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

MULTİMİX sadece ağızdan kullanım içindir. MULTİMİX'i 6 yaşından küçük çocuklara su, meyve suyu veya mamaya karıştırarak, 6 yaşından büyük çocuklara kahvaltı ile birlikte verebilirsiniz. Doktorunuz MULTİMİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer MULTİMİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MULTİMİX kullandıysanız

Çocuğunuz MULTİMİX'ten kullanması gerekenden fazlasını kullanmışsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MULTİMİX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çocuğunuza çift doz MULTİMİX vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MULTİMİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

A ve D vitamini fazlalığı (A vitamininin fazla alınmasına bağlı olarak kafa içi basıncı artar, kusma ve iştahsızlık gelişir. Yüksek dozda alınan D vitamini sonucu kemiklerden belirgin derecede kalsiyum çözülümüne bağlı olarak kandaki kalsiyum miktarı aşırı yükselir. Bu durumun uzun sürmesi özellikle bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerilemeye neden olur.)

Bunlar MULTİMİX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "fıaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. MULTİMİX'in saklanması

MULTİMİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MULTİMİX'i kullanmayınız.

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Ruhsat sahibi:

GM-BAY Sağlık Ürünleri ithalat, tihiracat ve Ticaret Limited Şirketi
Mimarsinan Mah. Mimarsinan Cad. No:5/16
Çekmeköy/İstanbul
Tel: 0 216 639 01 32-33
Faks: 0 216 639 01 34
e-posta: gbayat@gmbay.com.tr

Üretim yeri:

Abdilbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı 16.06.2017 tarihinde onaylanmıştır.

A20013394/00



180x240 MM